


# 子どもの 予防接種スケジュール

この予防接種スケジュールは、標準的なスケジュールの例として作成しています。予防接種スケジュールについては、「予防接種と子どもの健康」の冊子を参考にしながら立ててください。また、接種については、お子さんの体調、病気の流行状況を見て接種医と相談して決めてください。

	標準的な接種時期	0歳											1歳											2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳				
		出生時	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月									
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
定期 予防 接種 (※1 無料)	Hib(ヒブ) ワクチン	不活化	①—②—③の間はそれぞれ3~8週間あける ③—④の間はおおむね7~13か月で接種											④																				
	小児用肺炎球菌	不活化	①—②—③の間はそれぞれ27日以上あける ③—④の間は60日以上あけて1歳~1歳3か月で接種											④																				
	四種混合	不活化	①—②—③の間はそれぞれ3~8週間あける ③—④の間は6か月以上あけて、標準的には											④																				
	*三種混合	不活化	③終了後12~18か月の間に接種											←→																				
	*不活化ポリオ	不活化	①—②—③の間はそれぞれ3~8週間あける ③—④の間は6か月以上あけて、標準的には ③終了後12~18か月の間に接種											④																				
	BCG	生	標準的には生後5月~8月に至るまでの期間に接種											←→																				
	麻しん・風しん(MR)	生	①1歳の出来るだけ早期に接種 ②【年長児】小学校入学前の1年間											①																				
任意 接種 (※2 有料)	日本脳炎	不活化	3歳に2回、4歳に1回 1期:初回は6~28日間隔で2回、追加は初回終了後、おおむね1年後に1回											←→																				
	B型肝炎	不活化	①—②の間は4週間隔 ①—③の間は20~24週経過後											③																				
	ロタウイルス	生	生後6週から接種可能											① ② 注)生後6週から接種可能、24週までに2回目を完了 ① ② ③ 注)生後6週から接種可能、32週までに3回目を完了																				
	水痘	生	1歳以上											①																				
	インフルエンザ	不活化	①—②の間は4週											①、②(毎年、流行前の10月、11月などに)																				

## 【ワクチンの種類が違う場合の接種間隔】



ただし、医師が必要と認めた場合には同時接種が可能

定期予防接種の対象年齢 ←→ 標準的な接種期間  
(○の中の数字は何回目の接種かを表す)  
任意接種推奨期間 ←→ 任意接種の接種可能な期間

※1 接種間隔・スケジュールが守られない場合は、自己負担が生じることがあります。  
※2 予防接種法に基づかない予防接種。接種費用は自己負担です。